

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ПРОСПАН®

Сироп от кашля

Регистрационный номер: П N011382/01 от 19.01.2006

Торговое название: Проспан®

Лекарственная форма: сироп

Состав

1 мл препарата содержит:

Действующее вещество:

сухой экстракт листьев плюща (5-7.5:1) 7,00 мг

Другие компоненты:

очищенная вода 566,66
мг

калия сорбат 1,34 мг

лимонная кислота безводная 0,50 мг

раствор сорбитола (кристаллизованный) 550,00
мг

камедь ксантана 1,50 мг

вишневый аромат 3,00 мг

Описание

Светло-коричневый, слегка мутноватый сироп с запахом вишни.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающее средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие

Растительный препарат от кашля. Оказывает отхаркивающее, муколитическое и спазмолитическое действие.

Снижает вязкость мокроты и способствует ее отхождению.

Показания к применению

В качестве отхаркивающего средства в терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и легких, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. С осторожностью: непереносимость фруктозы (применение возможно только под контролем врача).

Применение во время беременности и кормления грудью

Применение препарата в периоды беременности и кормления грудью возможно по назначению врача.

Способ применения и дозы

внутри грудным детям (0-1 год) по 2,5 мл 2 раза в день. Маленьким детям (1-6 лет) по 2,5 мл 3 раза в день.

Детям школьного возраста и подросткам по 5 мл 3 раза в день.

Взрослым по 5-7,5 мл 3 раза в день.

Дозирование препарата производится с помощью мерного стаканчика. Курс лечения определяется тяжестью заболевания, минимальный курс лечения должен составлять 1 неделю. Для закрепления терапевтического эффекта рекомендуется после исчезновения симптомов болезни продолжить лечение еще в течение 2-3 дней. При отсутствии улучшения состояния необходимо обратиться к врачу.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Очень редко при применении препарата может наблюдаться слабительный эффект (вследствие содержания сорбитола).

Передозировка

Прием дозы, значительно превышающей предписанную дневную дозу (больше, чем в 3 раза) может вызвать тошноту, рвоту и диарею. В этом случае пациент должен обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

Препарат не содержит алкоголя, сахара и красителей.

В процессе хранения возможно легкое помутнение сиропа и незначительные изменения вкуса, что не влияет на терапевтическое действие препарата.

Перед употреблением взбалтывать!

Форма выпуска

Сироп; по 100 мл или 200 мл во флаконы темного стекла с полиэтиленовой пробкой-дозатором, навинчиваемой крышкой и мерным колпачком. Каждый флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше +25°C.

Хранить в местах, недоступных для детей!

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Энгельхард Арцнаймиттель ГмбХ и Ко. КГ

Херцбергштрассе 3

Д-61138 Нидердорфельден

Германия

